

## FICHA TÉCNICA

### **NOMBRE DEL PRODUCTO**

ALEXIN® 75 LS

### **NÚMERO DE REGISTRO**

25.498

### **COMPOSICIÓN**

Fosfonato potásico 75,5% p/v (755 g/l).

### **FORMULACIÓN**

Concentrado soluble (SL)

### **DESCRIPCIÓN**

Fungicida anti-mildiu sistémico para la vid.

Fungicida sistémico que actúa de forma preventiva (a largo plazo). Su formulación líquida permite una dosificación y manejo sencillos, así como una preparación homogénea de la dilución que se mantiene en perfecta disolución.

El fosfonato potásico tiene una acción directa sobre el control de la enfermedad, así como un efecto indirecto potenciando el sistema de defensa natural de la planta, de forma que el riesgo de desarrollo de resistencias es prácticamente inexistente. Además, presenta una sistemía ascendente y descendente, distribuyéndose por toda la planta una vez absorbido a través de las hojas. Por tanto, protege también los órganos vegetativos en crecimiento.

### **CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA**

P261 Evitar respirar la niebla.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.

### **PRESENTACIÓN**

Envases de 1 L y 5 L.

### **APLICACIONES AUTORIZADAS**

Tratamientos fungicidas preventivos en:

**Viña:** control de mildiu.

## FICHA TÉCNICA

### DOSIS Y RECOMENDACIONES DE USO

**ALEXIN® 75 LS** está autorizado en el control de mildiu en viña, a una dosis de 0,4 - 2% de producto en un volumen máximo de caldo de 1.000 l/ha, sin superar la dosis máxima de 4 l/ha.

**ALEXIN® 75 LS** debe aplicarse mediante pulverización foliar con tractor o manual (en vid de cultivo alto) y mediante pulverizador con tractor en vid de cultivo bajo con un máximo de 1 aplicación por campaña durante el periodo comprendido entre la aparición de la 6ª hoja hasta el cerrado del racimo. Evitar el punto de goteo ajustando la presión y la velocidad de avance de la maquinaria de manera que se cubra la vegetación de forma suficiente. Se recomienda tratar ambas caras de las líneas.

En el marco de las buenas prácticas agrícolas (manejo de posibles resistencias) se recomienda utilizar **ALEXIN® 75 LS** en combinación con productos de contacto para el control de mildiu antes que aparezca la enfermedad.

Para un buen control del mildiu, el tratamiento con **ALEXIN® 75 LS** debe ser preventivo, es decir, el producto debe aplicarse antes de la aparición de la enfermedad.

#### PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Llenar el tanque hasta la mitad, añadir **ALEXIN® 75 LS** y completar con agua manteniendo la disolución en agitación. Utilizar la mezcla en el mismo día de su preparación.

### PLAZO DE SEGURIDAD

14 días

### PRECAUCIONES

Repetir el tratamiento en caso de lluvias en las 2 horas siguientes al tratamiento.

No aplicar con temperaturas elevadas ni antes de la poda.

No mezclar con fertilizantes que contengan Nitrógeno.

**Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones contenidas en la etiqueta del envase (cultivos, dosis, precauciones, etc.). La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondiente**